С.П. Князев,
Е.Г. Гордеев,
Е.А. Чернышев,
МИТХТ им. М.В. Ломоносова

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КОНФИГУРАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДИКАРБА- КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАНОВ(12)

УДК 546.271+544.16

Методами квантовой химии в приближении $V3LYP/6-311G(2d,2p)$ в диапазоне температур 298–1000 К проведен расчет термодинамических параметров реакций изомеризации $1,2-C_2B_{10}H_{12} \leftrightarrow 1,7-C_2B_{10}H_{12}$ и $1,7-C_2B_{10}H_{12} \leftrightarrow 1,12-C_2B_{10}H_{12}$, которые согласуются в пределах ошибки измерения с экспериментальными данными.

ВВЕДЕНИЕ.

Дикарба-клозо-додекабораны(12): *o*-, *m*- и *n*-карборан и их производные являются перспективными компонентами биологически-активных веществ. В частности они входят в состав препаратов для нейтронозахватной терапии рака [1], активных аминокислот [2] и пептидов [3, 4]. Сегодня медицинская химия карборанов является динамично развивающейся областью химии, что подчёркивает значимость этих соединений в качестве составляющих биологически-активных веществ.

В настоящее время существует большое количество работ по экспериментальному исследованию химических свойств карборанов(12), однако до сих пор количественные характеристики реакционной способности карборанов(12) крайне немногочисленны и зачастую противоречивы, поэтому задача количественной оценки реакционной способности карборанов(12) с использованием современных методов вычислительной квантовой химии является актуальной. Экспериментальное определение термодинамических параметров реакций с участием клозо-карборанов и их производных трудоёмко, а полученные данные не всегда достоверны. Данная работа посвящена изучению возможности расчёта этих важнейших технологических параметров квантово-химическими методами.

МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЙ.

Квантово-химические расчеты молекул *o*-, *m*-, *n*-карборанов проводились методом

DFT($V3LYP$) в базисе $6-311G(2d,2p)$ с использованием программного комплекса Gaussian 98 Revision A.7 [5]. Отклонения рассчитанных межатомных расстояний от экспериментальных значений [6] составляют 0.02–0.05 Å. В рамках данного уровня теории адекватно описываются электронные параметры 12-ти вершинных карборанов: дипольный момент (μ) и первый потенциал ионизации (U). Для *o*-карборана экспериментальные значения μ составляют 4.31 [6], расчетные значения 4.22 Д. Экспериментальные значения U для *o*-карборана 10.10 эВ [7], расчетное значение 8.77 эВ. Таким образом, выбранное приближение адекватно для описания электронных и энергетических параметров клозо-карборанов(12).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Одним из характерных свойств изомеров карборанов(12) является способность их молекул при температурах 700–1000 К к перегруппировкам каркаса в направлении $o \rightarrow m \rightarrow n$ -изомер, обзор которых приведён в [8]. При этом экспериментально доказано, что *o*-изомер нацело перегруппировывается в *m*-изомер, а между *m*- и *n*-изомерами устанавливается равновесие (при 920–970 К свободная энергия, ΔG изомеризации *m*-карборана в *n*-карборан – около $0.25 \text{ ккал}\cdot\text{моль}^{-1}$) [9]. Ранее [10] в ограниченных базисах (до $6-31G(d,p)$), без учета корреляционных поправок были рассчитаны термодинамические параметры в стандартных условиях реакции изомеризации карборанов(12).

Мы провели расчеты в приближении $V3LYP/6-311G(2d,2p)$ термодинамических параметров реакции изомеризации карборанов(12) в диапазоне температур 298–1000 К и давлении 1 атм.

Рис. 1. Зависимость изменения энтальпии (ΔH , ккал·моль⁻¹) и энергии Гиббса (ΔG , ккал·моль⁻¹) реакций (1) (а) и (2) (б) от температуры (T , К).

Анализ полученных данных показал (рис. 1), что реакция (1) в рассматриваемом диапазоне температур полностью смещена в сторону продуктов (ΔG изменяется от -15.9 до -15.4 ккал·моль⁻¹).

Для реакции (2) при температурах 600–1000 К между *m*- и *n*-карбораном устанавливается равновесие (ΔG изменяется от -0.95 до +0.25 ккал·моль⁻¹). Рассчитанное из значений ΔG содержание *n*-карборана в равновесной смеси в данном интервале температуры при этом составляет (69–47 %). При температуре 900 К $\Delta G = 0$ и в равновесной смеси можно ожидать равные концентрации *m*- и *n*-карборанов. Рассчитанная нами величина ΔH^0 реакции (1) - 16.00 ккал·моль⁻¹ в пределах ошибки измерения

согласуется с величиной ΔH^0 экспериментально определенной из теплот сгорания карборанов(12) равной $-18 \pm 3,5$ ккал·моль⁻¹ (в газовой фазе) [11]. Отметим также достаточно хорошее совпадение рассчитанных нами термодинамических параметров и экспериментально определенных из положения равновесия реакции 2 (при 950 К $\Delta G_{\text{расч.}} = +0.10$ ккал·моль⁻¹, $\Delta G_{\text{эксп.}} = +0.25$ ккал·моль⁻¹ [9]).

Полученные данные свидетельствуют о возможности расчёта методами квантовой химии термодинамических параметров (энергии Гиббса, энтальпии и энтропии) реакций рассматриваемых соединений с экспериментальной точностью

ЛИТЕРАТУРА:

1. J.F. Valliant, K.J. Guenther, A.S. King, P. Morel, P. Schaffer, O.O. Sogbein, K.A. Stephenson // *Coord. Chem. Rev.*, 2002, v. 232, pp. 173-230.
2. A.N. Soloway, W. Tjarks, A. Barnum, F.-G. Rong, R.F. Barth, I.M. Codogni, J.G. Wilson // *Chem. Rev.*, 1998, v. 98, p. 1515.
3. R.J. Nachman, P.E.A. Teal, P.A. Radel, G.M. Holman, R.L. Abernathy // *Peptides*, 1996, v. 17, p. 747.
4. B. Qualmann, M.M. Kessels, F. Klobasa, P.W. Jungblut, W.D. Sierralta // *J. Microsc.*, 1996, v. 183, p. 2617.
5. M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, V. G. Zakrzewski, J. A. Montgomery, Jr., R. E. Stratmann, J. C. Burant, S. Dapprich, J. M. Millam, A. D. Daniels, K. N. Kudin, M. C. Strain, O. Farkas, J. Tomasi, V. Barone, M. Cossi, R. Cammi, B. Mennucci, C. Pomelli, C. Adamo, S. Clifford, J. Ochterski, G. A. Petersson, P. Y. Ayala, Q. Cui, K. Morokuma, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. Cioslowski, J. V. Ortiz, A. G. Baboul, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, J. L. Andres, C. Gonzalez, M. Head-Gordon, E. S. Replogle, and J. A. Pople, *Gaussian-98, Revision A.7*, Gaussian, Inc., Pittsburgh (PA), 1998.
6. В.И. Станко, В.В. Храпов, Т.А. Бабушкина // *Успехи химии*, 1974, т. 43, с. 1359.
7. W.M. Orlov, V.N. Pustobaev, T.Yu. Poroshina, V.A. O'shevskaya, L.I. Zakharkin, G.L. Gal'chenko // *Dokl. Phys. Chem.*, 1989, v. 309, p. 968.
8. Р. Граймс. Карбораны. Мир. Москва, 1974. 268 с.
9. L. I. Zakharkin // *Pure Appl. Chem.*, 1972, v. 29, p. 513.
10. K. Hermansson, M. Wojcik, S. Sjoberg // *Inorg. Chem.*, 1999, v. 38, p. 6039.
11. Г.Л. Гальченко, Л.Н. Мартыновская, Ю.В. Гольяпин, В.И. Станко // *Журн. общ. химии*, 1971, т. 41, с. 141.